

**เตือนภัยการเกษตร  
ช่วงวันที่ ๑๙ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓**

สภาพแวดล้อม/สภาพอากาศที่เกิดในช่วงเวลานี้	ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ	ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
อากาศเย็นตอนกลางคืน และเช้า ช่วงกลางวัน อากาศร้อน	๑. มังคุด	ผลอ่อน/ดอกบาน	เพลี้ยไฟ	<p>ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลายโดยการดูดน้ำเลี้ยง จากส่วนต่างๆ ของพืช</p> <p><u>ระยะออกดอกและติดผลอ่อน</u> อาจทำให้ดอกและผลอ่อนร่วง ผลที่ไม่ร่วงเมื่อ มีการพัฒนาผลโตขึ้น จะเห็นรอยทำลาย ชัดเจน เนื่องจากผิวเปลือกมังคุดมีลักษณะ ขรุขระที่เรียกว่า ผิวขึกหาก ทำให้ผลผลิตมี คุณภาพต่ำ</p> <p><u>ระยะแทรกยอดอ่อนและใบอ่อน</u> ทำให้ชังกการเจริญเติบโต แคระแกร็น หิงกง และใบใหม่ ต้นมังคุดขาดความสมบูรณ์</p>	<p>สำรวจการระบาดของเพลี้ยไฟบนใบอ่อน ดอก และผลอ่อน หากพบเพลี้ยไฟ จำนวนมากกว่า หรือเท่ากับ ๐.๒๕ ตัวต่อดอก หรือ ๑ ตัวต่อยอด หรือผลอ่อน ให้พ่นสารอินมาโคคลพริด ๑๐% เอสแอล อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ พิโพรนิล ๕% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ อะซีทามิพริด ๒๐% เอสพี อัตรา ๔ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ สเปนีโนเรม ๑๒% เอสซี อัตรา ๑๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ไม่ควรพ่นสารชนิดได ชนิดหนึ่ง ติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้ เพลี้ยไฟต้านทานต่อสารฆ่าแมลงได</p>
	๒.. ทุเรียน	ผลอ่อน/ดอกบาน	๑. หนอนจะผล	<p>ทำลายทุเรียนตั้งแต่ผลเล็ก อายุประมาณ ๒ เดือน ไปจนถึงผลใหญ่ทำให้ผลเป็นแผล อาจเป็นผลให้ ผลเน่าและร่วงเนื่องจากเชื้อราเข้าทำลายช้ำ ถ้าหากหนอนจะกินเข้าไปจนถึงเนื้อผล ทำให้ บริเวณดังกล่าวเน่ามีผลสุก ภายนอกผลทุเรียน จะสังเกตเห็นมูกและรังของหนอนได้อย่างชัดเจน และจะมีน้ำเหลืองมีสีขาวเรืองไกลแก่ ผลทุเรียน ที่อยู่ชิดติดกันหนอนจะเข้าทำลายมากกว่าผล ที่อยู่เดี่ยวๆ เพราะแมลงสืบทอดของบางไบบริเวณ</p>	<p>๑. หมั่นตรวจสอบทุเรียน เมื่อพบรอยทำลาย ของหนอนจะผล ให้ใช้มีหรือลดแข็งเชี่ย ตัวหนอนออกมาราทำลาย</p> <p>๒. ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไป โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกันควรใช้กิ่งไม้หรือ กาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ ตัวเต็มวัยวางไข่หรือตัวหนอนเข้าหลบอาศัย</p> <p>๓. การห่อผลด้วยถุงมุ้งในล่อง ถุงรีเมค หรือ ถุงพลาสติกสีขาวๆ นำรูที่บริเวณขอบล่าง</p>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
				รอยสัมผัสเนื้อ	<p>เพื่อให้หยดน้ำระบายออก โดยเริ่มท่อผล ตั้งแต่ผลทุเรียนมีอายุ ๖ สัปดาห์ เป็นต้นไป จะช่วยลดความเสียหายได้</p> <p>๔. สารจากแมลงที่มีประสิทธิภาพเมื่อจำเป็น ต้องใช้ คือ แคลมเบิร์ด้า-ไซยาโลทริน ๒.๕% อัตรา<sup>๒๐</sup> มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่น เฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของ หนอนเจ้าผล</p>
			๒. โรครากรน่า โคนน่า (เชื้อรา <i>Phytophthora palmivora</i> )	<p>อาการที่ราก เริ่มแรกจะเห็นใบที่ปลายกิ่งมีสีซีด ไม่เป็นมันเงา เที่ยวถู่ลง เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้น ใบจะเหลืองและหลุดร่วง หากชุดดูราก จะพบ รากรฝอยมีลักษณะเปลือกกล่อน และเปื่อยยุ่ย เป็นสีน้ำตาล เมื่อโรครุนแรงอาการน่าจะ lame ไปยังรากแขนงและโคนต้น ทำให้ต้นทุเรียนโทรม และยืนต้นตาย</p> <p>อาการที่กิ่งและที่ลำต้นหรือโคนต้น ระยะแรก จะเห็นทุเรียนแสดงอาการใบเหลืองเป็นบางกิ่ง สังเกตเห็นคล้ายครรภาน้ำบานผิวเปลือกของกิ่ง หรือต้น ในช่วงเช้าที่มีอากาศชื้นอาจเห็นเป็นหยด ของเหลวสีน้ำตาลแดงออกมากจากบริเวณแผล และจะค่อยๆ แห้งไปในช่วงที่มีเดดจัด ทำให้ เห็นเป็นครรภ เมื่อใช้มีดถูกบริเวณครรภนั้น<sup>๓</sup> จะพบเนื้อเยื่อเปลือกและเนื้อไม้เป็นแผ่นสีน้ำตาล ถ้าแพลงขยายใหญ่ลุกตามจนรอบโคนต้น จะทำให้</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>แปลงปลูกครรภมีการระบายน้ำดี ไม่รวมมี น้ำท่วมขัง และเมื่อมีน้ำท่วมขังควรรีบระบายน้ำ</li> <li>ปรับปรุงดิน โดยใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก</li> <li>ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจทำให้ราก หรือลำต้นเกิดแผล ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เชื้อรา สาเหตุโรคเข้าทำลายพืชได้ง่ายขึ้น</li> <li>ต้นทุเรียนที่เป็นโรครุนแรงมาก หรือยืนต้น<sup>๔</sup> แห้งตาย ควรขุดออกแล้วนำไปทำลายนอก แปลงปลูก แล้วรัดดินในหลุมและบริเวณ โดยรอบ ด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ฟอสฟิติล-อะลูมิเนียม ๘๐% ดับเบลยูพี อัตรา ๓๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ เมทาแอกซิล ๒๕% ดับเบลยูพี อัตรา ๓๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ทึ้งไว้ระยะหนึ่ง จึงปลูก ทดแทน</li> <li>ตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบส่วนของ</li> </ol>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
				<p>ทุเรียนใบรวมจนหมดต้น และยืนต้นแห้งตาย <u>อาการที่ใบ</u> ในช้า ดำเนินมีคล้ายถูกน้ำร้อนลวก และจะเกิดอาการไหม้ แห้งค่าตันอย่างรวดเร็ว พบรากช่วงผนกดกหนักต่อเนื่องหลายวัน</p>	<p>ก. ใบ ดอก และผลที่เป็นโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรค รวมทั้งเก็บผลเน่าที่ร่วงหล่นไป ทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารเมา合法กซิล ๒๕% ตับเบลลูพี อัตรา ๓๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ พอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% ตับเบลลูพี อัตรา ๓๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน ๑-๒ ครั้ง ทุก๗๑๐ วัน และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวผลอย่างน้อย ๑๕ วัน</p> <p>ก. ไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรค ไปใช้ต่อ กับต้นปกติ และควรทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง</p> <p>ก. เมื่อพับต้นที่ใบเริ่มมีเสื่อม ไม่เป็นมันเงา หรือใบเหลืองคลุกร่วง ใช้พอสไฟนิก แอซิด ๔๐% เอสแอล ผสมน้ำสะอาด อัตรา ๑:๑ ใส่กระบอกฉีดยาฉีดเข้าลำต้น อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่ำต้น และ/หรือราดดินด้วยพอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% ตับเบลลูพี อัตรา ๓๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ แมหา合法กซิล ๒๕% ตับเบลลูพี อัตรา ๓๐-๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร</p> <p>ก. เมื่อพบอาการโรคบนกิ่งหรือที่โคนต้น ถากหรือชุดผิวเปลือกบริเวณที่เป็นโรคออกแล้วท่าแพลด้วยพอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐%</p>

สภาพแวดล้อม/สภาพอากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่อาจเกิดผลกระทบ	ระยะการเจริญเติบโตของพืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					ดับเบลยูพี อัตรา ๘๐-๑๐๐ กรัมต่อน้ำ ๑ ลิตร หรือ เมทาแลกซิล ๒๕% ดับเบลยูพี อัตรา ๕๐-๖๐ กรัมต่อน้ำ ๑ ลิตร ทุก ๗ วัน จนกว่าผลจะแห้ง หรือ ใช้ฟอสฟอนิก แอซิด ๔๐% เอสแอล ผสมน้ำสะอาด อัตรา ๑:๑ ใส่ระบบอัตโนมัติ ใช้อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อด้าน ฉีดเข้าลำต้นหรือกึ่งในบริเวณข้ามอาการโรค หรือส่วนที่เป็นเนื้อไม้มีดีกลับบริเวณที่เป็นโรค ๙. หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ตัดแต่งกิ่ง เป็นโรค กิ่งแห้ง และตัดขั้วผลที่ค้างอยู่ นำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรค
มีฝนตกบางพื้นที่ (ภาคใต้)	๓. ปาล์มน้ำมัน	ระยะต้นกล้า	โรคใบไหม้ (เชื้อร่า <i>Curvularia oryzae</i> )	โรคนี้พบมากในระยะต้นกล้า และช่วง ๑ ปี แรกหลังลงแปลงปลูก มักพบอาการของโรคบนใบอ่อน ซึ่งส่วนมากจะเป็นช่วงที่ใบเริ่มคลี่ ลักษณะอาการเริ่มแรก เกิดจุดเล็กๆ สีเหลือง กระจายทั่วใบ ต่อมาแผลขยายใหญ่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลดำ ลักษณะบุบ ขอบแผลบุบ และมีวงสีเหลืองล้อมรอบ หากโรคระบาดรุนแรง แผลจะขยายรวมกัน ทำให้ใบไหม้แห้ง ม้วนอ และประชีกขาดง่าย มีผลให้ต้นกล้าชราจัก การเจริญเติบโต ถ้าอาการโรครุนแรงมากอาจทำให้ต้นกล้าตาย	๑. ใส่ปุ๋ยบำรุงให้ต้นกล้าแข็งแรง ๒. สังเกตใบอ่อนของต้นกล้า ซึ่งเป็นส่วนที่ง่ายต่อการเข้าทำลายของเชื้อร่า หากพบใบเป็นโรคเล็กน้อย ให้ตัดส่วนที่เป็นโรคออกไปทำลายนอกแปลงปลูก ๓. ต้นที่เป็นโรครุนแรง ต้องนำออกหากแปลงเพาะ เพื่อกำจัดแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค ๔. หากพบโรคยังคงระบาด พ่นด้วยสารเคมี เช่น ๘๐% ดับเบลยูพี อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน + ไดฟีโนโคนาโซล ๒๐% + ๑๒.๕% เอสซี

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลา	ชนิดพืชที่อาจเกิด ผลกระทบ	ระยะการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
					อัตรา ๒๐ มิลลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ไทรเม ๘๐% ดับเบลยูจี อัตรา ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ แคปแทน ๕๐% ดับเบลยูพี อัตรา ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ทุก ๗ วัน โดยไม่พ่นสารชนิดเดียวกันเนื่องกันเป็น เวลานาน ควรสลับชนิดสาร เพื่อป้องกันการ ต้านทานของเชื้อสาเหตุโรค และการให้ น้ำด้วยระบบพ่นฟอย
อากาศแห้งแล้ง	๔. อ้อย	ระยะแตกกอ ของอ้อยปลูกใหม่ และอ้อยตอ	หนอนกออ้อย	<p><b>หนอนกออ้อย</b> ที่สำคัญที่พบรเข้าทำลายอ้อย มี ๓ ชนิด คือ หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอ สีขาว และหนอนกอสีชมพู</p> <p><b>หนอนกอลายจุดเล็ก</b> หนอนจะเข้าไปตรงส่วนโคนระดับผิวดิน<sup>๑</sup> เข้าไปกัดกินส่วนที่กำลังเจริญเติบโตภายใน หน่ออ้อย ทำให้ยอดแห้งตาย การเข้าทำลาย ของหนอนกอลายจุดเล็กจะทำให้ผลผลิตอ้อย<sup>๒</sup> ลดลง ๕-๘๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้หนอนยัง<sup>๓</sup> เข้าทำลายอ้อยในระยะอ้อยย่างปล้อง โดย<sup>๔</sup> หนอนจะเข้าไปกัดกินอุ่นภัยในลำต้นอ้อย<sup>๕</sup> ซึ่งทำให้อ้อยแตกแขนงใหม่ และแตกยอดพุ่ม<sup>๖</sup></p> <p><b>หนอนกอสีขาว</b> หนอนจะใช้จากส่วนยอดเข้าไปกัดกินส่วน<sup>๗</sup> โคนยอดที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ยอดแห้งตาย<sup>๘</sup> โดยเฉพาะใบที่ยังมีวนอุ่น ส่วนใบยอดอื่นๆ ที่หนอน<sup>๙</sup></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ในแหล่งชลประทาน ควรให้น้ำเพื่อให้ อ้อยแตกหน่อชดเชย</li> <li>๒. ปล่อยแต่นเปียนไข่ไตรโคแกรมมา อัตรา ๓,๐๐๐ ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ปล่อยติดต่อกัน ๒-๓ ครั้ง ใช้ช่วงที่พบกลุ่มไข่ของหนอนกอ</li> <li>๓. เมื่ออ้อยอายุ ๑ เดือน หรือเมื่ออ้อยแสดง<sup>๑๐</sup> อาการยอดเหี่ยว ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ควรพ่น<sup>๑๑</sup> สารฆ่าแมลง เดลทาเมทริน ๓% อีซี อัตรา ๑๐ มิลลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่น ๒-๓ ครั้ง<sup>๑๒</sup> ห่างกัน ๑๔ วัน</li> <li>๔. เมื่อพบรการระบาดของหนอนกออ้อยและ<sup>๑๓</sup> ทำให้อ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยวมากกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ควรพ่นสารฆ่าแมลง<sup>๑๔</sup> อินดอกชาคาร์บ ๑๕% อีซี อัตรา ๕๕ มิลลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ คลอแรนทรานิลิโพรล ๕.๗๙% เอสซี อัตรา ๒๐ มิลลิตรต่อน้ำ ๒๐</li> </ol>

สภาพแวดล้อม/สภาพ อากาศที่เกิดในช่วงเวลาใด	ชนิดพืชที่อาจเกิด ผลกระทบ	รายการ เจริญเติบโตของ พืชในช่วงนี้	ปัญหาที่ควรระวัง	ข้อสังเกตลักษณะ/ อาการที่อาจพบ	แนวทางป้องกัน/แก้ไข
				<p>เข้าทำลายจะมีลักษณะหงิกงอ และมีรูปรุน เมื่ออ้อยมีลำเดล้วหนอนจะเข้าทำลายส่วนที่กำลังเจริญเติบโต ทำให้ไม่สามารถสร้างปล้องอ้อยให้สูงขึ้นไปได้อีก ตาอ้อยที่อยู่ต่ำกว่าส่วนที่ถูกทำลายจะแตกหน่อขึ้นมาทางด้านข้าง เกิดอาการแตกยอดพุ่ม</p> <p><b>หนองกอกสีเขมพู</b> หนองจะเข้าไปตรงส่วนโคนของหน่ออ้อยระดับผิวดิน เข้าไปทำลายส่วนที่กำลังเจริญเติบโต ภายในหนองอ้อย ทำให้ยอดแห้งตาย ถึงแม้หน่ออ้อยที่ถูกทำลายจะสามารถแตกหน่อใหม่เพื่อทดแทนหน่ออ้อยที่เสียไป แต่หน่ออ้อยที่แตกใหม่เพื่อทดแทนในระยะหลังจะมีอายุสั้นลง ทำให้ผลผลิตและคุณภาพของอ้อยลดลง</p>	<p>ลิตร หรือ ลูฟเคนนูรอน ๕% อีซี อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นโดยใช้น้ำ ๖๐ ลิตรต่อไร่</p>

- รายงาน : สถาบันวิจัยพืชสวน (นางสาวทิวา บุบผาประเสริฐ) ข้อมูลจาก ศวส.จันทบุรี  
 ผู้กลั่นกรอง : สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดลองพัฒนา (นางสาวสุรีรัตน์ ทองคำ) ข้อมูลจาก กลุ่มวิชาการ  
 : สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช